

# MATEMATIČKI KLOKAN

## Rješenja

# S

### Pitanja za 3 boda:

1. Brojevi 3, 4 i još dva nepoznata broja upisani su u polja tablice  $2 \times 2$ . Poznato je da je zbroj brojeva po retcima jednak 5 i 10, a zbroj po jednom stupcu je 9. Veći od ta dva nepoznata broja je

- A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 3

**Rješenje: B** Brojevi su 2 i 6.

2. Ako je  $x + y = 0$  i  $x \neq 0$ , tada je  $\frac{x^{2008}}{y^{2008}} =$

- A) -1      B) 0      C) 1      D)  $2^{2008}$       E)  $x/y$

**Rješenje: C**  $y = -x, (-x)^{2008} = x^{2008}$ , pa je razlomak jednak 1.

3. Matrica se sastoji od 21 stupca označenih brojevima 1,2,...,21 i 33 retka numeriranih brojevima 1,2,...,33. Obrišemo one retke čiji redni broj nije višekratnik od 3 i sve one stupce čiji redni broj je paran. Koliko je u matrici ostalo polja?

- A) 110      B) 121      C) 115.5      D) 119      E) 242

**Rješenje: B** Ostali su parni stupci, njih 11 i retci čiji je broj višekratnik od 3, njih 11. Ukupno je ostalo  $11 \cdot 11 = 121$  polje.


4. Koliko prostih brojeva  $p$  ima svojstvo da je i broj  $p^4 + 1$  prost broj?

- A) nijedan      B) 1      C) 2      D) 3      E) beskonačno

**Rješenje: B** Samo 2 ima to svojstvo, jer ostali prosti brojevi su neparni, pa je taj zbroj paran.

5. Dan je jednakokrtačan trokut  $ABC$  ( $|CA| = |CB|$ ).

Na osnovici je označena točka  $D$  tako da je  $|AD| = |AC|$  i  $|DB| = |DC|$ . Koliki je kut  $ACB$ ?



- A)  $98^\circ$       B)  $100^\circ$       C)  $104^\circ$       D)  $108^\circ$       E)  $110^\circ$

**Rješenje: D** Sa  $x$  označimo kut  $CAB$ . Tada je  $180^\circ - 2x = 90^\circ - x/2 + x$ , tj.  $x = 36^\circ$ , pa je traženi kut  $180^\circ - 2x = 108^\circ$ .


6. Najveća vrijednost funkcije  $f(x) = |5 \sin x - 3|$  u skupu  $\mathbf{R}$  iznosi:

- A) 2      B) 3      C)  $\pi$       D)  $5\pi$       E) 8

**Rješenje: E** Izraz  $5 \sin x - 3$  ima najveću vrijednost 2, a najmanju  $-8$ , pa je 8 maksimum funkcije  $f$ .

7. Promatramo rijeku od točke A. U svom toku račva se na dva rukavca. Prvi rukavac preuzima  $2/3$  količine vode, a drugi ostatak. Nakon toga se prvi rukavac opet račva u tri, pri čemu jedan novi rukavac preuzima  $1/8$  vode, drugi  $5/8$ , a treći ostatak. Nakon nekog vremena, taj treći se rukavac spaja s onim rukavcem rijeke nastalim pri prvom račvanju. Mapa rijeke prikazana je na slici. Kolika količina vode dolazi u mjesto B?

- A)  $\frac{1}{3}$       B)  $\frac{5}{4}$       C)  $\frac{2}{9}$       D)  $\frac{1}{2}$       E)  $\frac{1}{4}$



**Rješenje: D** Kroz prvi donji rukavac teče  $1/3$  vode, a kroz drugi najdonji rukavac teče  $\frac{2}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$  vode koja se spaja s drugim rukavcem, te sad teče  $1/2$  vode.

8. U kutiji je 7 karata. Brojevi od 1 do 7 napisani su na njima i to točno jedan broj na jednoj karti. Prvi igrač iz kutije na slučajajan način odabere 3 karte, a drugi igrač uzme 2 karte. Tada prvi igrač kaže drugome: "Znam da je zbroj brojeva na tvojim kartama paran." Koliki je zbroj brojeva na kartama prvog igrača?


- A) 10      B) 12      C) 6      D) 9      E) 15

**Rješenje: B** Ako je prvi igrač uzeo 1,2 ili 3 neparne karte, tada je u kutiji ostala barem jedna neparna, te prvi igrač ne može znati je li drugi dobio paran ili neparan zbroj. A budući da prvi igrač tvrdi da zna da je zbroj paran, slijedi da je on izvukao sve 3 parne karte, i njihov zbroj je  $2+4+6=12$

### Pitanja za 4 boda:

9. Svaka od kocaka na slici ima bridove duljine 1. Kolika je udaljenost od točke A do točke B?

- A)  $\sqrt{17}$       B) 7      C)  $\sqrt{13}$       D)  $\sqrt{7}$       E)  $\sqrt{14}$




**Rješenje: A** Radi se o prostornoj dijagonali kvadra s bridovima 3,2,2.

10. Matilda je nacrtala 36 klockana koristeći tri različite boje. 25 klockana ima obojano nešto žutom, 28 ih ima smeđe, a za 20 klockana je koristila crnu boju. Samo 5 od njih ima na sebi sve tri boje. Koliko klockana imaju na sebi samo jednu boju?

- A) 0      B) 4      C) 12      D) 31      E) nemoguće je odrediti

**Rješenje: B** Označimo sa  $ž, s, c$  broj jednobojnih klockana, a sa  $žs, žc, sc$  broj dvobojnih klockana. Tada je  $(ž+s+c) + (žs+žc+sc) + 5 = 36$ ,  $ž+žs+žc+5=25$ ,  $s+žs+sc+5=28$ ,  $c+žc+sc+5=20$ . Zbrojimo li zadnje tri jednačbe dobivamo  $(ž+s+c) + 2(žs+žc+sc) = 58$ . Iz te i prve jednačbe dobivamo da je  $ž+s+c=4$ .

11. Tri se kruga diraju u parovima kao na slici. Polumjer svakoga je  $r$ . Kolika je površina područja A omeđenog s ta tri kruga?




- A)  $\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)r^2$     B)  $\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)r^2$     C)  $\frac{1}{8}\pi r^2$     D)  $\left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}\right)\pi r^2$     E)  $\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)r^2$

**Rješenje: A** Kad spojimo središta tih triju kružnica dobivamo jednakostranični trokut. Dakle, kutevi su  $60^\circ$ , a to su ujedno središnji kutevi kružnih lukova koji omeđuju područje A. Kad dužinama spojimo vrhove područja A dobivamo jednakostraničan trokut stranice  $r$ , a površinu A ćemo dobiti tako da od površine jednakostraničnog trokuta oduzmemo tri površine kružnog odsječka.

Površina kružnog odsječka je  $P_1 = \frac{r^2\pi}{360^\circ} \cdot 60^\circ - \frac{r^2\sqrt{3}}{4} = r^2\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ , pa je površina

od A jednaka  $P = \frac{r^2\sqrt{3}}{4} - 3P_1 = r^2\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)$ .

12. Dva pravilna šesterokuta na slici su jednaka. Kolika je površina paralelograma osjenčana?



- A)  $\frac{1}{2}$       B)  $\frac{1}{3}$       C)  $\frac{1}{4}$       D)  $\frac{1}{5}$       E)  $\frac{1}{6}$

**Rješenje: A** Neka je  $a$  stranica šesterokuta. Tada je  $4a$  stranica paralelograma, a visina mu je jednaka trostrukom polumjeru upisane kružnice šesterokuta, tj.  $v = \frac{3a\sqrt{3}}{2}$ . Površina

paralelograma je  $P = 6a^2\sqrt{3}$ , a površina šesterokuta je  $P = 3a^2\sqrt{3}$ , što je upravo polovina paralelograma. Dakle, osjenčana je polovina paralelograma.

13. Brojnik i nazivnik razlomka su negativni cijeli brojevi. Brojnik je veći od nazivnika. Koja od sljedećih tvrdnji o tom razlomu je istinita?

- A) Razlomak je manji od  $-1$ .    B) Razlomak je između  $-1$  i  $0$ .    C) Razlomak je pozitivan broj manji od  $1$ .    D) Razlomak je veći od  $1$ .    E) Ne može mu se odrediti predznak.

**Rješenje: C**

14. Ako je  $x^2yz^3 = 7^3$  i  $xy^2 = 7^9$ , tada je  $xyz =$

- A)  $7^4$       B)  $7^6$       C)  $7^8$       D)  $7^9$       E)  $7^{10}$

**Rješenje: A** Pomnožimo obje jednakosti i izvadimo treći korijen. Dobivamo  $xyz = 7^4$ .

15. Tri su točke izabrane na slučajan način iz skupa točaka na slici. Kolika je vjerojatnost da su te točke kolinearne?



- A)  $\frac{1}{12}$       B)  $\frac{1}{11}$       C)  $\frac{1}{16}$       D)  $\frac{1}{8}$       E)  $\frac{3}{12}$

**Rješenje: B** Od 12 točaka tri možemo izabrati na  $\frac{12!}{3!9!} = 220$  načina. Broj povoljnih izbora

je 4 (za 3 vertikalne točke), 4 (za dijagonalne) i  $4 \cdot 3$  (za horizontalne točke), ukupno 20

povoljnih događaja. Vjerojatnost je  $p = \frac{20}{220} = \frac{1}{11}$ .

16. Na natjecanju Matematički Kup zadano je 5 problema koji svi nose različiti broj bodova. Damjan je riješio svih pet i pri tome je osvojio svih 10 bodova koje je bilo moguće osvojiti na dva problema s najmanjim brojem bodova. Osim toga, za dva problema s najvećim brojem bodova dobio je svih 18 bodova. Koliko je bodova osvojio Damjan?

- A) 30      B) 32      C) 34      D) 35      E) 40

**Rješenje: D** Kad bi prva dva zadatka (s najmanjim brojem bodova) donosili 1 i 9 bodova, tada bi svaki od zadnja dva morao biti s više od 9 bodova, no tada njihov zbroj nije 18. Dakle, kombinacija 1 i 9 za prva dva zadatka otpada. Na sličan način se eliminiraju i kombinacije 2 i 8, 3 i 7, pa preostaje samo da prva dva zadatka imaju 4 i 6 bodova, a a onda zadnja dva moraju imati 8 i 10, a treći 7. Zbroj je 35.

**Pitanja za 5 bodova:**

17. Duljine stranica kvadra u centrimetrima su prirodni brojevi koji čine geometrijski niz s kvocijentom 2. Koji od brojeva mogu biti obujam tog kvadra?

- A)  $120 \text{ cm}^2$     B)  $188 \text{ cm}^2$     C)  $216 \text{ cm}^2$     D)  $350 \text{ cm}^2$     E)  $500 \text{ cm}^2$

**Rješenje: C** Najmanju duljinu označimo s  $a$ . Tada ostale stranice imaju duljinu  $2a$  i  $4a$ , tj. volumen je  $V = 8a^3$ . Jedino broj 216 možemo napisati kao umnožak 8 i nekog kuba,  $216 = 8 \cdot 3^3$ .

18. U ovom računu svaka zvjezdica označava jednu znamenku. Koliki je zbroj svih znamenaka u rezultatu ovog množenja?

- A) 16      B) 20      C) 26      D) 30  
E) neki drugi odgovor

$$\begin{array}{r} * * * \\ \times 1 * * \\ \hline 2 2 * * \\ + 9 0 * \\ \hline * * 2 \\ \hline 5 6 * * * \end{array}$$

**Rješenje: A** Faktori su 452 i 125, produkt je 56500 i zbroj znamenaka je 16.

19. Nađi vrijednost izraza  $x^2 + y^2 + z^2$ , ako je  $x + y + z = 1$  i  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ .

- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) nemoguće je odrediti


**Rješenje: B** Kad drugu jednakost pomnožimo sa zajedničkim nazivnikom dobivamo  $xy + xz + yz = 0$ . Kad prvu jednakost kvadriramo dobivamo  $x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) = 1$ , pa je  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

20. Kružnica je upisana trokutu  $ABC$ , pri čemu je  $|AC| = 5$ ,  $|AB| = 6$  i  $|BC| = 3$ .

Dužina  $\overline{ED}$  dodiruje kružnicu. Koliki je opseg trokuta  $ADE$ ?

- A) 7      B) 4      C) 9      D) 6      E) 8

**Rješenje: E** Označimo s  $x$  duljinu  $|EC|$  i s  $y$  duljinu  $|BD|$ . Iz svojstva tangencijalnog četverokuta imamo da je  $3+z=x+y$ , gdje je  $z$  duljina  $|ED|$ . Opseg trokuta  $ADE$  je  $z+(5-x)+(6-y)=11+z-x-y=11-3=8$ .



21. Niz je zadan ovako:  $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \cdot n$ , za  $n \geq 1$ ,

i  $a_1 = 0$ . Ako je  $a_k = 2008$ , koliki je  $k$ ?

- A) 2008      B) 2009      C) 4017      D) 4018      E) neki drugi

**Rješenje: C** Uočavamo da su članovi niza  $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots$  4016-ti član niza je  $-2008$ , pa je 2008 4017-ti član.

22. Broj  $3^{32} - 1$  ima točno dva djelitelja koji su veći od 75 i manji od 85. Koliki je produkt tih djelitelja?


- A) 5852      B) 6560      C) 6804      D) 6888      E) 6972

**Rješenje: B** Rastavom na faktore pomoću formule za razliku kvadrata dobivamo  $3^{32} - 1 = (3^2 - 1)(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)$ , pa su traženi djelitelji 80 i 82, a produkt im je 6560.

23. Kvadrat  $ABCD$  ima stranice duljine 1. Ako je točka  $M$  polovište stranice  $\overline{AB}$ , kolika je površina osjenčanog područja?

- A)  $\frac{1}{24}$       B)  $\frac{1}{16}$       C)  $\frac{1}{8}$       D)  $\frac{1}{12}$       E)  $\frac{2}{13}$

**Rješenje: D** Označimo sjecište dijagonala sa  $S$ , sjecište dijagonale



$\overline{AC}$  i dužine  $\overline{DM}$  s  $T$ , a četvrti vrh osjenčanog područja s  $U$ . Označimo  $\alpha = \angle AMT$ ,  $\beta = \angle ATM$ ,  $y = |TM|$ . Iz sinusovog poučka za trokut  $ATM$  imamo:  $y = \frac{\sin 45^\circ}{2 \sin \beta}$ , iz

trokuta  $ADM$  imamo  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ,  $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ . Osjenčano područje je četverokut s

okomitim dijagonalama  $SM$  i  $TU$ . Pri tome je  $|SM| = \frac{1}{2}$ , a

$$\frac{1}{2} |TU| = y \cos \alpha = \frac{\sin 45^\circ \cos \alpha}{2 \sin \beta} = \frac{\sin 45^\circ \cos \alpha}{2 \sin(180^\circ - 45^\circ - \alpha)} = \frac{1}{6} \cdot P = \frac{|SM| \cdot |TU|}{2} = \frac{1}{12}.$$

24. Ako je  $\sin x + \cos x = m$ , tada je  $\sin^4 x + \cos^4 x =$

- A)  $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$       B)  $1 + \frac{(1-m^2)^2}{2}$       C)  $\frac{1-(1-m^2)^2}{2}$       D)  $m^4$       E)  $m^4 + 1$

**Rješenje: A** Kvadriranjem izraza  $\sin x + \cos x = m$  dobivamo  $\sin x \cos x = \frac{1}{2}(m^2 - 1)$ .

Iz  $(\sin x + \cos x)^4 = m^4$  dobivamo

$\sin^4 x + \cos^4 x + 4 \sin x \cos x (\sin^2 x + \cos^2 x) + 6 \sin^2 x \cos^2 x = m^4$ , pa uvrštavanjem izraza za

produkt  $\sin x \cos x$  dobivamo da je  $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$ .