

Najtoplije zahvaljujem **prof. Milanu Šariću** na dopuštenju da dijelove knjižice
"Matematička natjecanja u Jugoslaviji 1988. godine - za učenike osnovnih škola"
skeniram i objavim na <http://public.carnet.hr/mat-natj> .


Antonija Horvatek
<http://public.carnet.hr/~ahorvate>

DMM »PITAGORA« BELI MANASTIR

PRIEDIO
MILAN SARIĆ

MATEMATIČKA NATJECANJA U JUGOSLAVIJI 1988. GODINE

ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA



Beli Manastir, 1989.

D M M »P I T A G O R A« BELI MANASTIR

P R I R E D I O

M I L A N Š A R I Ć

MATEMATIČKA NATJECANJA U JUGOSLAVIJI 1988. GODINE

ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Recenzent

Luka Čeliković, prof.

Grafički crteži i prilozi

Radanović Marija

Tekst otipkao

Peran Josip, dipl. ecc.

Beli Manastir, 1989.

Tisak GRO »SLOVO« Beli Manastir

XIX SAVEZNO TAKMIČENJE
MLADIH MATEMATIČARA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

VII RAZRED

- Šestina od ukupne količine neke robe prodana je sa zaradom od 20%, a polovina ukupne količine iste robe prodana je sa gubitkom od 10%. Sa koliko procenata (postotaka) zarade treba prodati ostatak robe da bi se pokrio gubitak?
- Dan je broj n čije su znamenke (cifre) 60 sedmica i izvjestan broj nula. Dokazati da je vrijednost razlomka $\frac{n-27}{3}$ cio broj, a vrijednost razlomka $\frac{n+27}{9}$ nije cio broj.
- Odrediti prirodne brojeve n_1, n_2, \dots, n_k (koji ne moraju biti različiti medju sobom) tako da je $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k = 1988$ i $n_1 + n_2 + \dots + n_k = 1988$. Koliko ima različitih rešenja? ($k > 1$)
- Na simetrali spoljašnjeg ugla (vanjskog kuta) kod temena (vrha) C trougla (trokuta) ABC izabrana je proizvoljna tačka M. Dokazati da je $MA + MB \geq AC + BC$.
- U jednakokrakom (jednakokračnom) trouglu (trokutu) ABC, $AC = BC$, kome je ugao (kut) $\sphericalangle ACB = 80^\circ$, data je tačka O, takva da je $\sphericalangle BAO = 10^\circ$ i $\sphericalangle ABO = 30^\circ$. Izračunati ugao $\sphericalangle ACO$.

VIII RAZRED


- Dva broda kreću iz mjesta A i B jedan drugome u susret. Svaki od njih kad stigne u jedno mjesto vraća se natrag u ono drugo. Prvi put brodovi se susreću na 5 km od A, a drugi put na 3 km od B. Odrediti rastojanje od A do B.
- Date su linearne funkcije (jednadžbe pravaca) $y = -1$, $y = \frac{3}{2}x - 4$, $y = \frac{1}{4}x + \frac{7}{2}$ i $y = 2x + 7$. Izračunati koordinata temena (vrhova) i površinu četvorougla (četverokuta) kojeg ograničavaju grafovi datih funkcija.
- Dokazati da razlika broja u zapisu sastavljenog od 100 jedinica i broja u zapisu sastavljenog od 50 dvojki, predstavlja kvadrat cijelog broja.

- U pravougaoniku (pravokutnik) ABCD tačka M je na stranici CD takva, da je $DM = 2 \text{ CM}$. Ako se prave (pravci) AC i BM seku pod pravim uglom (kutom), izračunati ugao $\sphericalangle BOM$, gde je tačka O preseka (sjecište) dijagonala.
- Dan je troukut (trougao) ABC i tačka M unutar njega. Dokaži, da je $AM \cdot BC + BM \cdot AC + CM \cdot AB \geq 4P$, pri čemu je P površina trougla (trougla) ABC.

REŠENJA

VII RAZRED

- Neka je k ukupna količina robe, a c planirana cena. Iz datih podataka dobijamo jednačinu $\frac{k}{5} \cdot 0,2c + \frac{k}{3} \cdot x \cdot c = \frac{k}{2} \cdot 0,1c$, gde je x traženi procenat. Rešavajući po x dobijamo $x = 0,05 = 5\%$.
- Zbir cifara broja n je $60 \cdot 7 = 420$. Dakle, n je deljivo sa 3, pa je i $n-27$ deljivo sa 3. Kako 420 nije deljivo sa 9, to ni n nije deljivo sa 9, pa zbog toga ni $n+27$ nije deljivo sa 9.
- Zbog $1988 = 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 71$ i $2+2+7+71=82$, jedno od rešenja će biti $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k = 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 71 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1$ (1906 jedinica). Rešenja ima 10 (onoliko koliko ima različitih načina faktorisanja broja 1988).
- Neka je D tačka na produžetku duži BC, takva da je $CD=CA$ (tj. simetrična sa A u odnosu na CM). Lako se dokazuje da su trouglovi ACM i DCM podudarni, pa je $DM=AM$. Zbog toga je: $MA+MB = MD+MB > BD = BC+CD = BC+AC$.



- Neka je M presečna tačka visine CD trougla i prave BO (slika). Trougao ABM je jednakokrak, pa je $\sphericalangle MAB = \sphericalangle MBA = 30^\circ$. Prema tome: $\sphericalangle CAM = 20^\circ = \sphericalangle MAO$. Sem toga je $\sphericalangle ACD = 40^\circ$ (polovina od 80°) i $\sphericalangle AOM = \sphericalangle OAB + \sphericalangle OBA = 40^\circ$. Trouglovi AOM i AMC imaju po dva jednaka ugla i zajedničku stranicu AM, pa su podudarni. Zbog toga je $AO=AC$, pa je AOC jednakokrak trougao i zbog $\sphericalangle CAO = 40^\circ$ dobijamo da je $\sphericalangle ACO = 70^\circ$.

1. Označimo rastojanje od A do B sa x , brzine brodova sa v_1 i v_2 , vreme do prvog susreta sa t_1 , a vreme od prvog do drugog susreta sa t_2

Onda je $v_1 t_1 = 5$, $v_2 t_1 = x - 5$, $v_1 t_2 = 3 + (x - 5)$ i $v_2 t_2 = 5 + (x - 3)$.

Iz $\frac{5}{x-2} = \frac{x-5}{x+2}$ dobijamo $12x - x^2 = 0$, pa je zbog $x > 0$, $x = 12$.


2. Označimo sa A, B, C i D pomenuta temena kao na slici. Njihove koordinate su $A(-4, -1)$, $B(2, -1)$, $C(6, 5)$, $D(-2, 3)$.

Tražena površina je

$$P = \frac{1}{2} AE \cdot ED + \frac{1}{2} (ED + BF) \cdot$$

$$\cdot EB + \frac{1}{2} BF \cdot h_{BF} = \frac{2 \cdot 4}{2} + \frac{4 + 5}{2} \cdot$$

$$4 + \frac{5 \cdot 4}{2} = 32.$$





3. $111\dots11 - 222\dots22 = \frac{1}{9}(10^{100} - 1) - \frac{2}{9}(10^{50} - 1) =$

$$= \frac{1}{9}(10^{100} - 1 - 2 \cdot 10^{50} + 2) = \frac{1}{9}(10^2 \cdot 50 - 2 \cdot 10^{50} + 1) = \left(\frac{10^{50} - 1}{3}\right)^2.$$

Kako je $10^{50} - 1$ deljivo sa 9, to je deljivo i sa 3, pa je tvrdjenje dokazano.

4. Neka je E središte stranice BC. Tada je $OE \perp BC$. Dakle, tačka H (slika) je ortocentar trougla OBC, pa je $CH \perp OB$. Međutim, OH je srednja linija trougla DBM, pa je $OH = \frac{1}{2} DM = MC$. Zbog toga je četvorougao OHCM paralelogram i $OM \parallel CH$, a otuda i $OM \perp OB$.



5. Neka su B_1 i C_1 podnožja normala iz B i C na pravu AM (slika). Tada je $P(ABM) = \frac{1}{2} AM \cdot BB_1$ i $P(ACM) = \frac{1}{2} AM \cdot CC_1$, odakle

$$P(ABM) + P(ACM) = \frac{1}{2} AM (BB_1 + CC_1) \leq \frac{1}{2} AM \cdot BC. \text{ Analogno se dobija}$$

$$P(ACM) + P(BCM) \leq \frac{1}{2} CM \cdot AB \text{ i } P(ABM) + P(BCM) \leq \frac{1}{2} BM \cdot AC.$$

Sabirajući te tri relacije dobijamo tvrdjenje koje se dokazuje.